２００４年度幾何学特別演習Ｉ演習問題　　６月１４日

復習問題１．（１）平面上あるいは空間上の正規形の１階常微分方程式とは何か。
（２）平面上あるいは空間上の正規形の１階常微分方程式の解の存在と一意性の定理を述べよ。

復習問題２．次の常微分方程式を解け。但し、初期値は $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ とする。

$$(1)\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \qquad (2)\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

演習問題１．コンパクト多様体 M 上のフロー φ_t を考える。
(1)　１点 $x_0 \in M$ に対し、$\varphi_t(x_0)$ が t について定値写像ではないとする。このとき、ある実数 T $(T \geqq 0)$ が存在し、「$\varphi_{t_1}(x_0) = \varphi_{t_2}(x_0)$ ならば、整数 n があって、$t_2 - t_1 = nT$ となる」ことを示せ。
(2)　１点 $x_0 \in M$ に対し、$\varphi_t(x_0)$ を考える。M の点 y で、y の任意の近傍 $U_y \subset M$ に対し、$\sup\{t \in \mathbf{R} \mid \varphi_t(x_0) \in U_y\} = +\infty$ となるものが存在することを示せ。

演習問題２．$(a,b,c) \in \mathbf{R}^3$ は $(0,0,0)$ ではないとする。$\mathbf{R}^2$ 上の関数

$$f(x,y) = (2+\cos y)(a\cos x + b\sin x) + c\sin y$$

は、$\mathbf{R}^2/(2\pi\mathbf{Z})^2$ 上の関数 $F : \mathbf{R}^2/(2\pi\mathbf{Z})^2 \longrightarrow \mathbf{R}$ を定義する。F の臨界点の個数が有限個であるための条件を述べよ。臨界点におけるヘッシアンが退化するかどうか調べよ。

演習問題３．n 次元実ベクトル空間の開集合 U 上の常微分方程式 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbf{x} = F(t,\mathbf{x})$ に対し、$F(t,\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} f_1(t,\mathbf{x}) \\ \vdots \\ f_n(t,\mathbf{x}) \end{pmatrix}$ が $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ について（t に対して一様に）リプシッツであるとし、このような常微分方程式の解の存在と一意性、解の初期値やパラメータに対する連続性はわかっているとする。
さらに、$F(t,\mathbf{x})$ は $\mathbf{x}$ について、C^1 級であるとする。このとき、$t = t_0$ において初期値 $\mathbf{x}^0$ を持つ解 $\Phi(t,\mathbf{x}^0) = \begin{pmatrix} \varphi_1(t,\mathbf{x}^0) \\ \vdots \\ \varphi_n(t,\mathbf{x}^0) \end{pmatrix}$ は、初期値 $\mathbf{x}^0$ について C^1 級で、$A_{ij}(t,\mathbf{x}^0) = \dfrac{\partial \varphi_i}{\partial x_j^0}(t,\mathbf{x}^0)$ は $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}A_{ij}(t,\mathbf{x}^0) = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f_i}{\partial x_k}(t,\Phi(t,\mathbf{x}^0))A_{kj}(t,\mathbf{x}^0)$ を満たすことを示せ。

ヒント：$F(t,\mathbf{x}+\mathbf{v}) - F(t,\mathbf{x}) = \sum v_i G_i(t,\mathbf{x},\mathbf{v})$ とする連続関数 $G_i(t,\mathbf{x},\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} G_{i1}(t,\mathbf{x},\mathbf{v}) \\ \vdots \\ G_{in}(t,\mathbf{x},\mathbf{v}) \end{pmatrix}$ が存在する（６月７日復習問題１）。さらに、$G_i(t,\mathbf{x},0) = \dfrac{\partial F}{\partial x_i}(t,\mathbf{x},0)$ である。$\left(s, \dfrac{1}{s}(\Phi(t,\mathbf{x}^0+s\mathbf{v}) - \Phi(t,\mathbf{x}^0))\right)$ の満たす常微分方程式についての解の存在と一意性、解のパラメータに対する連続性を用いる。